

Anlage 2: Regelmäßig auftretende Vogelarten - Abschtungstabelle

Art-ID ①	Artnamen (wissenschaftl.) ②	Artnamen (deutsch) ③	RL ④	BS ⑤	EU ⑥	D ⑦	Erhaltungszustand (Entwurf) ⑧	Habitatkomplexe ⑨													Bestand in Sachsen ⑩	Bemerkungen ⑪			
								Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer, inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchtrümland/-staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen			Fels-/Gesteins-/Offenbiodiotope	Bergbaubiotope	
626	<i>Corvus corone</i>	Aaskrähne				bg																		9.000 – 18.000 BP	
231	<i>Calidris alpina</i>	Alpenstrandläufer	-	G	-	sg	unbekannt			x	x												x	keine Angabe, Gastvogel	
460	<i>Turdus merula</i>	Amsel				bg																		120.000 – 240.000 BP	
293	<i>Tetrao urogallus</i>	Auerhuhn	1	J	VRL-I	sg	schlecht	x																keine aktuellen Brutvorkommen bekannt	
208	<i>Haematopus ostralegus</i>	Austernfischer	R	B	-	bg	unbekannt			x	x	x											x	1 – 2 BP	nur-unregelmäßig brütend
439	<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze				bg																		20.000 – 40.000 BP	
498	<i>Panurus biarmicus</i>	Bartmeise	R	B	-	bg	unzureichend					x	x										x	30 – 40 BP	
287	<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke	2	B		sg	unzureichend	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	100 – 200 BP	
432	<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper	V			bg																		35.000 – 70.000 BP	
336	<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine	2	B		sg	*schlecht			x	x	x	x		x	x	x						x	180 – 220 BP	sehr starker Rückgang und deutliche Arealeinbußen führen zu schlechtem Erhaltungszustand
246	<i>Aythya marila</i>	Bergente	-	G	-	bg	unbekannt			x	x												x	keine Angabe, Gastvogel	
435	<i>Anthus spinoletta</i>	Bergpieper		G		bg	unbekannt			x	x	x					x	x	x				x	keine Angabe, Gastvogel	nach 2000 ausnahmsweise Brutvogel im MTB 5543-
614	<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise				bg																		600 – 1.000 BP	
408	<i>Merops apiaster</i>	Bienenfresser	R	B	-	sg	unzureichend			x	x				x							x	x	10 – 20 BP	neuere Brutansiedlungen z. B. im Kreis-Meißen
544	<i>Carduelis flammea</i>	Birkenzeisig				bg																		1.200 – 2.400 BP	
292	<i>Tetrao tetrix</i>	Birkhuhn	1	J	VRL-I	sg	schlecht	x						x	x	x	x						x	20 – 30 Ind.	
220	<i>Anser albifrons</i>	Blässgans	-	G	-	bg	unbekannt								x	x	x						x	keine Angabe, Gastvogel	
303	<i>Fulica atra</i>	Blässralle	V	J	-	bg	*unzureichend			x	x												x	3.000 – 6.000 BP	
449	<i>Luscinia svecica</i>	Blaukehlchen	R	B	VRL-I	sg	unbekannt			x	x	x	x			x							x	2 – 4 BP	
604	<i>Parus caeruleus</i>	Blauzeisig				bg																		60.000 – 150.000 BP	
642	<i>Carduelis cannabina</i>	Bluthänfling	V			bg																		12.000 – 30.000 BP	
431	<i>Anthus campestris</i>	Brachpieper	2	B	VRL-I	sg	unzureichend								x								x	300 – 500 BP	Anmerkungen zur Verbreitung: In Südwestsachsen nur Durchzügler; kann auf dem Zug theoretisch überall auftreten
232	<i>Tadorna tadorna</i>	Brandgans	R	B	-	bg	unzureichend			x	x												x	1 – 2 BP	in zentralen Artdatenbank des LFULG ein sicherer Brutnachweis (2000) aus dem NSG "Prudel Döhlen"
454	<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	3	B		bg	unzureichend					x	x	x	x	x	x	x					x	2.500 – 5.000 BP	
349	<i>Tringa glareola</i>	Bruchwasserläufer	-	G	VRL-I	sg	unbekannt			x	x	x						x	x				x	keine Angabe, Gastvogel	
636	<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink				bg																		300.000 – 600.000 BP	
415	<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht				bg																		15.000 – 30.000 BP	
523	<i>Corvus monedula</i>	Dohle	3	B		bg	unzureichend	x	x							x		x	x	x				900 – 1600 BP	in der zentralen Artdatenbank des LFULG überwiegend Darstellung von Durchzugsnachweisen
337	<i>Gallinago media</i>	Doppelschnepfe	-	G	VRL-I	sg	unbekannt					x	x			x	x							keine Angabe, Gastvogel	
482	<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	V	B		bg																		20.000 – 40.000 BP	
476	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drosselrohrsänger	3	B	-	sg	unzureichend			x	x	x											x	600 – 900 BP	
344	<i>Tringa erythropus</i>	Dunkler Wasserläufer	-	G	-	bg	unbekannt			x	x	x											x	keine Angabe, Gastvogel	
618	<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher				bg																		10.000 – 20.000 BP	
247	<i>Somateria mollissima</i>	Eiderente	-	G	-	bg	unbekannt			x	x												x	keine Angabe, Gastvogel	
250	<i>Clangula hyemalis</i>	Eisente	-	G	-	bg	unbekannt			x	x												x	keine Angabe, Gastvogel	
407	<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	3	J	VRL-I	sg	unzureichend			x	x													350 – 500 BP	
619	<i>Pica pica</i>	Elster				bg																		7.000 – 14.000 BP	
641	<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig				bg																		2.000 – 5.000 BP	
296	<i>Phasianus colchicus</i>	Fasan				bg																		2.000 – 4.000 BP	
424	<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	V	B		bg	*unzureichend							x	x			x	x				x	100.000 – 300.000 BP	deutliche Abnahme => unzureichender Erhaltungszustand
469	<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl				bg																		2.000 – 4.000 BP	
633	<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	V			bg																		30.000 – 70.000 BP	
647	<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel				bg																		1.000 – 3.000 BP	
282	<i>Pandion haliaetus</i>	Fischadler	R	B	VRL-I	sg	unzureichend	x		x	x												x	25 – 30 BP	anhaltende Zunahme, aber bislang nur lokal in Sachsen => unzureichender Erhaltungszustand
491	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	V			bg																		60.000 – 100.000 BP	
315	<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer		B		sg	*unzureichend			x	x												x	500 – 700 BP	
374	<i>Sterna hirundo</i>	Flussseeschwalbe	2	B	VRL-I	sg	*schlecht			x	x												x	100 – 200 BP	Art ist derzeit von Artenhilfsmaßnahmen abhängig => schlechter Erhaltungszustand
354	<i>Actitis hypoleucos</i>	Flussuferläufer	2	B	-	sg	*schlecht			x	x												x	20 – 40 BP	aufgrund hoher Gefährdung des Bruthabitats bei sehr geringem Bestand wird Erhaltungszustand schlecht bewertet; in der zentralen Artdatenbank des LFULG überwiegend Darstellung von Durchzugsnachweisen

Art-ID ①	Artnamen (wissenschaftl.) ② <small>* Hervorhebung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen</small>	Artnamen (deutsch) ③ <small>* Hervorhebung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen</small>	RL ④	BS ⑤ <small>Betrachtungsschwerpunkt B=Brutvogel, G= Gastvogel, J=Jahresvogel</small>	EU ⑥ <small>VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I</small>	D ⑦ <small>bg=besonders geschützt, sg=streng geschützt</small>	Erhaltungszustand (Entwurf) ⑧ <small>*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung anhand des RL-Status</small>	Habitatkomplexe ⑨												Bestand in Sachsen ⑩ <small>Angaben entstammen Brutvogelatlas u.a. Quellen (BP=Brutpaare, Ind. = Individuen)</small>	Bemerkungen ⑪ <small>Bemerkungen, insbes. zur Einschätzung des Erhaltungszustandes und zur Verbreitung</small>	
								Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillegewässer, inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchgrünland/-staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen			Höhlen, Bergwerksanlagen
257	<i>Mergus merganser</i>	Gänseäger	R	B+G	-	bg	unbekannt												1-3 BP			
510	<i>Certhia brachyactyla</i>	Gartenbaumläufer				bg														8-000-16-000 BP		
483	<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	V			bg														46-000-90-000 BP		
453	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	V			bg														9-000-18-000 BP		
438	<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze				bg														2-000-4-000 BP		
477	<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	V			bg														20-000-40-000 BP		
651	<i>Pyrhula pyrrhula</i>	Gimpel	V			bg														4-000-8-000 BP		
637	<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	V			bg														12-000-25-000 BP		
556	<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	V	B		bg	günstig	x	x				x	x				x		25 000 - 50 000 BP		
319	<i>Pluvialis apricaria</i>	Goldregenpfeifer	-	G	VRL-I	sg	unbekannt			x	x									keine Angabe, Gastvogel		
564	<i>Miliaria calandra</i>	Graumammer	2	J		sg	unzureichend						x						x	1 000 - 1 500 BP	in den letzten Jahren Ausbreitung nach sehr starkem Rückgang vor 1990, durch veränderte Agrarparameter wieder Rückgang => unzureichender Erhaltungszustand	
222	<i>Anser anser*</i>	Graugans*	-	B+G	-	bg	günstig													400-600 BP	vor allem bei den Meldungen in SW-Sachsen dürfte es sich zum Teil um unbestimmte „graue Gänse“ (Bläss- und Saatgans) handeln, die falsch in die zentrale Artendatenbank des LFULG eingegeben wurden	
206	<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher		J		bg	günstig	x	x	x	x									1 600 - 2 000 BP		
494	<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper				bg															10-000-20-000 BP	
412	<i>Picus canus</i>	Grauspecht		J	VRL-I	sg	*unzureichend	x	x				x								300 - 600 BP	
343	<i>Numenius arquata</i>	Großer Brachvogel	1	B		sg	schlecht			x	x	x								x	keine aktuellen Brutvorkommen bekannt	
639	<i>Carduelis chloris</i>	Grünfink	V			bg															25-000-50-000 BP	
	<i>Phylloscopus trochiloides</i>																				0-1 BP	singuläre Vorkommen im gesamten sächsischen Bergland möglich; Brutnachweis im Ostergebirge in zentraler Artendatenbank fehlend
485	<i>Grünlaubsänger</i>		R	B	-	bg	unzureichend															
347	<i>Tringa nebularia</i>	Grünschenkel	-	G	-	bg	unbekannt	x	x												keine Angabe, Gastvogel	
413	<i>Picus viridis</i>	Grünspecht		J		sg	günstig	x	x				x	x							1 000 - 2 000 BP	
272	<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht		J		sg	günstig	x	x		x										700 - 900 BP	
496	<i>Ficedula albicollis</i>	Halsbandschnäpper	R	B	VRL-I	sg	unbekannt	x	x												2-4 BP	
291	<i>Bonasa bonasia</i>	Haseelhuhn	0	B	VRL-I	bg	unbekannt	x	x												keine aktuellen Angaben zu Brutvorkommen	
422	<i>Galerida cristata</i>	Haubenlerche	2	J		sg	*schlecht								x	x					500 - 800 BP	sehr starker Rückgang und deutliche Arealeinbußen führen zu schlechtem Erhaltungszustand
502	<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise	V			bg															15-000-30-000 BP	
188	<i>Podiceps cristatus</i>	Haubentaucher	-	B+G	-	bg	günstig			x	x										800-1-300 BP	
452	<i>Phoenicurus oerhueros</i>	Hausrotschwanz				bg															40-000-80-000 BP	
632	<i>Passer domesticus</i>	Hausperling	V			bg															150-000-300-000 BP	
444	<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	V			bg															25-000-50-000 BP	
423	<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	2	B	VRL-I	sg	unzureichend	x													1-500-3-000 BP	
366	<i>Larus fuscus</i>	Heringsmöwe	-	G	-	bg	unbekannt			x	x										keine Angabe, Gastvogel	bislang 1 Brutnachweis
213	<i>Cygnus olor*</i>	Höckerschwan*		J		bg	günstig			x	x	x									500 - 650 BP	
387	<i>Columba oenas</i>	Hohлтаube		B		bg	günstig	x	x												1 500 - 3 000 BP	
334	<i>Philomachus pugnax</i>	Kampfläufer	-	G	VRL-I	sg	unbekannt			x	x	x									keine Angabe, Gastvogel	
649	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmingimpel	R	B	-	sg	unzureichend	x	x	x	x										20-40 BP	
552	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kernbeißer				bg															10-000-25-000 BP	
323	<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz	2	B+G	-	sg	*schlecht			x	x	x	x								500-1-000 BP	starke Bestandabnahme und Arealverluste => schlechter
329	<i>Pluvialis squatarola</i>	Kiebitzregenpfeifer	-	G	-	bg	unbekannt			x	x	x									keine Angabe, Gastvogel	
481	<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke	V			bg															15-000-30-000 BP	
607	<i>Sitta europaea</i>	Kleiber				bg															30-000-60-000 BP	
299	<i>Porzana parva</i>	Kleinralle	R	B	VRL-I	sg	unzureichend			x	x										6-15 BP	
419	<i>Dendrocopos minor</i>	Kleinspecht				bg															1-500-3-000 BP	
240	<i>Anas querquedula</i>	Knäkente	1	B+G	-	sg	schlecht			x	x	x									30-50 BP	
324	<i>Calidris canutus</i>	Knutt	-	G	-	bg	unbekannt			x	x										keine Angabe, Gastvogel	
506	<i>Parus major</i>	Kohlmeise				bg															100-000-300-000 BP	
242	<i>Netta rufina</i>	Kolbenente	-	B+G	-	bg	unbekannt			x	x										3-5 BP	
628	<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe				bg															700-900 BP	
196	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran	R	B+G	-	bg	günstig			x	x	x									222 BP	
269	<i>Circus cyaneus</i>	Kornweihe	1	B	VRL-I	sg	schlecht														0-1 BP	unregelmäßiger Brutvogel, in der Karte überwiegend Darstellung von Durchzugsnachweisen
304	<i>Grus grus</i>	Kranich	2	B+G	VRL-I	sg	*günstig	x		x	x	x									150-200 BP	in SW-Sachsen kein Brutvogel, Nachweise in der zentralen Artendatenbank des LFULG betreffen Durchzügler
237	<i>Anas crecca</i>	Krickente	3	J	-	bg	*schlecht	x		x	x	x									60-120 BP	

Art-ID ①	Artnamen (wissenschaftl.) ② <small>* Hervorhebung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen</small>	Artnamen (deutsch) ③ <small>* Hervorhebung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen</small>	RL ④	BS ⑤ <small>Betrachtungsschwerpunkt B=Brutvogel, G=Gastvogel, J=Jahresvogel</small>	EU ⑥ <small>VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I</small>	D ⑦ <small>bg=besonders geschützt, sg=streng geschützt</small>	Erhaltungszustand (Entwurf) ⑧ <small>* begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung anhand des RL-Status</small>	Habitatkomplexe ⑨												Bestand in Sachsen ⑩ <small>Angaben entstammen Brutvogelatlas u.a. Quellen (BP=Brutpaare, Ind. = Individuen)</small>	Bemerkungen ⑪ <small>Bemerkungen, insbes. zur Einschätzung des Erhaltungszustandes und zur Verbreitung</small>
								Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillegwässer, inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchtgrünland/-staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderaltflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen		
391	Cuculus canorus	Kuckuck	V	B		bg	*unzureichend	x		x	x	x	x					x	4 000 – 8 000 BP	deutlicher Rückgang der Art bedingt unzureichenden Erhaltungszustand	
219	Anser brachyrhynchus	Kurzschneibeln	-	G		bg	unbekannt				x	x	x					x	keine Angabe, Gastvogel		
362	Larus ridibundus	Lachmöwe	V	J		bg	*unzureichend			x	x		x	x	x			x	4 500 - 7 500 BP	starker Rückgang und Aufgabe vieler Brutplätze bedingen unzureichenden Erhaltungszustand	
241	Anas clypeata	Löffelente	1	B+G		bg	schlecht			x	x			x	x			x	20 – 30 BP		
369	Larus marinus	Mantelmöwe	-	G		bg	unbekannt			x	x							x	keine Angabe, Gastvogel		
405	Apus apus	Mauersegler				bg													15 000 – 30 000 BP		
274	Buteo buteo	Mäusebussard		B		sg	günstig	x	x				x		x	x			5000 - 9000 BP		
429	Delichon urbica	Mehlschwalbe	V			bg													30 000 – 60 000 BP		
286	Falco columbarius	Merlin	-	G	VRL-I	sg	unbekannt						x	x	x	x		x	keine Angabe, Gastvogel		
467	Turdus viscivorus	Misteldrossel				bg													5 000 – 10 000 BP		
258/7	Larus michahellis	Mittelmeermöwe	R-(als We)	J		bg	unzureichend			x	x				x			x	Bestand nicht bekannt	Brutvorkommen nur lokal in NW- und NO-Sachsen	
256	Mergus serrator	Mittelsäger	-	G		bg	unbekannt			x	x							x	keine Angabe, Gastvogel		
417	Dendrocoptes medius	Mittelspecht	3	J	VRL-I	sg	unzureichend	x	x										70 – 100 BP		
484	Sylvia atricapilla	Mönchsgrasmücke				bg													70 000 – 150 000 BP		
244	Aythya nyroca	Moorente	0	B	VRL-I	sg	schlecht												3 – 9 BP	wieder aktueller Brutvogel in der Lausitz und im Leipziger Raum (hier: ausgewilderte Tiere); übrige Nachweise in der zentralen Artdatenbank beziehen sich auf Durchzügler	
318	Charadrius morinellus	Mornellregenpfeifer	-	G	VRL-I	sg	unbekannt			x	x				x			x	keine Angabe, Gastvogel		
448	Luscinia megarhynchos	Nachtigall				bg													2 500 – 5 000 BP		
627	Corvus corone cornix	Nebelkrähe				bg													unter Aaskrähe		
514	Lanius collurio	Neuntöter		B	VRL-I	bg	günstig			x			x	x	x	x			6 000 – 12 000 BP		
353	Phalaropus lobatus	Odinswasserläufer	-	G	VRL-I	sg	unbekannt					x	x						keine Angabe, Gastvogel		
190	Podiceps auritus	Ohrentaucher	-	G	VRL-I	sg	unbekannt												keine Angabe, Gastvogel		
559	Emberiza hortulana	Ortolan	2	B	VRL-I	sg	unzureichend			x					x				400 – 600 BP	regelmäßiger Brutvogel aktuell nur in Ost- und Nordsachsen	
235	Anas penelope	Pfeifente	-	G		bg	unbekannt			x	x	x		x	x			x	keine Angabe, Gastvogel		
341	Limosa lapponica	Pfuhlschnepe	-	G	VRL-I	bg	unbekannt			x	x								keine Angabe, Gastvogel		
512	Oriolus oriolus	Pirol	V			bg													4 000 – 8 000 BP		
184	Gavia arctica	Prachtaucher	-	G	VRL-I	bg	unbekannt			x	x								keine Angabe, Gastvogel		
207	Ardea purpurea	Purpurreiher	-	B+G	VRL-I	sg	unbekannt					x	x						0 – 1 BP	ausnahmsweise Brutvogel in MTB 4840; übrige Angaben in der zentralen Artdatenbank des LFULG betreffen Einzelvögel (Irrgast)	
626	Corvus corone corone	Rabenkrähe				bg													unter Aaskrähe		
372	Sterna caspia	Raubseeschwalbe	-	G	VRL-I	sg	unbekannt					x							keine Angabe, Gastvogel		
516	Lanius excubitor	Raubwürger	2	J		sg	*schlecht			x			x	x	x	x			150 – 200 BP		
427	Hirundo rustica	Rauchschwalbe	V	B		bg	*unzureichend			x	x	x		x	x	x			40 000 – 120 000 BP	Abnahme => unzureichender Erhaltungszustand	
403	Aegolius funereus	Raufußkauz	3	J	VRL-I	sg	unzureichend	x											200 – 400 BP		
294	Perdix perdix	Rebhuhn	2	J		bg	*schlecht												200 - 400 BP	sehr starker Rückgang und deutliche Arealeinbußen führen zu schlechtem Erhaltungszustand	
342	Numerius phaeopus	Regenbrachvogel	-	G		bg	unbekannt												keine Angabe, Gastvogel		
245	Aythya fuligula*	Reiherente*	-	J		bg	günstig			x	x								1 300 – 2 000 BP		
459	Turdus torquatus	Ringdrossel	R	B		bg	unzureichend	x	x										ca. 10 BP	Zentrale Artdatenbank des LFULG enthält überwiegend Durchzugsnachweise, Bruten nur in MTB 5543	
227	Branta bernicla	Ringelgans	-	G		bg	unbekannt						x	x					keine Angabe, Gastvogel		
388	Columba palumbus	Ringeltaube				bg													25 000 – 50 000 BP		
562	Emberiza schoeniclus	Rohrhammer				bg													9 000 – 18 000 BP		
199	Botaurus stellaris	Rohrdommel	1	J	VRL-I	sg	*unzureichend												50 – 70 BP	Zunahme => unzureichender Erhaltungszustand	
471	Locustella luscinioides	Rohrschwirl	R	B		sg	unzureichend												40 – 60 BP	in SW-Sachsen nur Durchzügler	
268	Circus aeruginosus	Rohrweihe		B	VRL-I	sg	günstig			x	x			x	x	x			600 – 900 BP		
285	Falco vespertinus	Rotfußfalke	-	G	VRL-I	sg	unbekannt			x			x	x	x				keine Angabe, Gastvogel		
229	Branta ruficollis	Rothalsgans	-	G	VRL-I	sg	unbekannt						x	x					keine Angabe, Gastvogel		
189	Podiceps grisegena	Rothalsstaucher	2	B		sg	*schlecht												50 – 60 BP	starker Rückgang und Aufgabe vieler Brutplätze bedingen schlechten Erhaltungszustand	
446	Erithacus rubecula	Rotkehlchen				bg													90 000 – 180 000 BP		
262	Milvus milvus	Rotmilan		B	VRL-I	sg	günstig	x	x					x	x	x			800 – 1 100 BP		
345	Tringa totanus	Rotschenkel	1	B+G		sg	schlecht			x	x	x			x				4 – 6 BP		
216	Anser fabalis	Saatgans	-	G		bg	unbekannt						x	x	x				keine Angabe, Gastvogel		
524	Corvus frugilegus	Saatkrähe	3	B		bg	*schlecht			x									1 500 – 2 000 BP	in zentraler Artdatenbank des LFULG überwiegend Durchzugsnachweise	
310	Recurvirostra avosetta	Säbelschnäbler	-	G	VRL-I	sg	unbekannt												keine Angabe, Gastvogel		
252	Melanitta fusca	Santente	-	G		bg	unbekannt			x	x								keine Angabe, Gastvogel		
325	Calidris alba	Sanderling	-	G		bg	unbekannt			x	x								keine Angabe, Gastvogel		

Art-ID ①	Artnamen (wissenschaftl.) ②	Artnamen (deutsch) ③	RL ④	BS ⑤	EU ⑥	D ⑦	Erhaltungszustand (Entwurf) ⑧	Habitatkomplexe ⑨												Bestand in Sachsen ⑩	Bemerkungen ⑪
								Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer, inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchgrünland/-staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen		
316	Charadrius hiaticula	Sandregenpfeifer	-	G	-	sg	unbekannt											x	keine Angabe, Gastvogel		
436	Motacilla flava	Schafstelze	3	B	-	bg	unzureichend				x	x	x						x	3 000 – 6 000 BP	
254	Bucephala clangula	Schellente	-	J	-	bg	günstig	x	x	x	x							x	400 – 600 BP	Nachweise im Bergland sowie in SW- und Mittelsachsen betreffen	
473	Aerocephalus schoenobaenus	Schilfrohrsänger	2	B	-	sg	*schlecht				x	x	x					x	150 – 200 BP		
470	Locustella fluviatilis	Schlagschwirl	3	B	-	bg	unzureichend				x								x	100 – 150 BP	
392	Tyto alba	Schleiereule	3	J	-	sg	unzureichend							x	x	x	x		x	400 – 600 BP	
236	Anas strepera	Schnatterente	-	B+G	-	bg	*unzureichend				x	x						x	200 – 300 BP		
499	Aegithalos caudatus	Schwanzmeise	-	G	-	bg	unbekannt												x	3 500 – 7 000 BP	
191	Pediceps nigricollis	Schwarzhalstaucher	2	B	-	sg	*schlecht				x							x	100 – 150 BP		
455	Saxicola torquata	Schwarzkehlchen	R	B	-	bg	*günstig											x	200 – 400 BP		
359	Larus melanocephalus	Schwarzkopfmöwe	R	B+G	VRL-I	bg	unzureichend				x	x						x	30 – 40 BP		
261	Milvus migrans	Schwarzmilan	-	B	VRL-I	sg	günstig	x	x	x	x	x						x	300 – 400 BP		
414	Dryocopus martius	Schwarzspecht	-	J	VRL-I	sg	*unzureichend	x	x									x	1 200 – 1 800 BP	tendenzielle Abnahme => unzureichender Erhaltungszustand	
208	Ciconia nigra	Schwarzstorch	2	B	VRL-I	sg	unzureichend	x	x	x	x	x						x	40 – 60 BP		
263	Haliaeetus albicilla	Seeadler	2	J	VRL-I	sg	*günstig	x	x	x	x	x						x	70 – 80 BP		
330	Calidris ferruginea	Sichelstrandläufer	-	G	-	bg	unbekannt				x	x						x	keine Angabe, Gastvogel		
366	Larus argentatus	Silbermöwe	R	J	-	bg	unzureichend											x	40 – 60 BP, siehe Kommentar	angegebener Brutbestand umfasst auch Steppen- und Mittelmeermöwe, da Arten nicht getrennt; Mehrzahl der Brutvögel sind Silbermöwen; Brutvorkommen nur lokal in NW- und NO-Sachsen	
295	Egretta alba	Silberreiher	-	G	VRL-I	sg	unbekannt				x	x	x					x	keine Angabe, Gastvogel		
465	Turdus philomelos	Singdrossel	V	G	-	bg	unbekannt				x	x	x					x	40 000 – 80 000 BP		
215	Cygnus cygnus	Singschwan	R	B+G	VRL-I	sg	unzureichend				x	x	x					x	8 – 10 BP		
493	Regulus ignicapillus	Sommergoldhähnchen	-	G	-	bg	unbekannt												15 000 – 30 000 BP		
273	Accipiter nisus	Sperber	3	J	-	sg	unzureichend	x	x									x	700 – 900 BP		
480	Sylvia nisoria	Sperbergrasmücke	3	B	VRL-I	sg	unzureichend	x	x					x	x			x	1 000 – 1 500 BP		
397	Glaucidium passerinum	Sperlingskauz	3	J	VRL-I	sg	*günstig	x					x					x	200 – 400 BP		
239	Anas acuta	Spießente	-	G	-	bg	unbekannt				x	x						x	keine Angabe, Gastvogel		
447	Luscinia luscinia	Sprosser	R	B	-	bg	unbekannt												2 – 4 BP	Brutnachweise bestehen für MTB 4741 und 4752; übrige Nachweise in zentraler ArtDatenbank des LFJLG beziehen sich auf Durchzügler (diese nur unvollständig erfasst)	
529	Sturnus vulgaris	Star	-	G	-	bg	unbekannt	x	x	x	x								70 000 – 140 000 BP		
398	Athene noctua	Steinkauz	1	J	-	sg	schlecht				x								5 – 10 BP	derzeitige Brutverbreitung wesentlich geringer als die Nachweise in der zentralen ArtDatenbank vermuten lassen; Beobachtungen im Erzgebirge betreffen keine aktuellen Brutvorkommen	
456	Oenanthe oenanthe	Steinschmätzer	2	B	-	bg	*schlecht											x	300 – 600 BP	da nennenswerte Brutvorkommen aktuell nur noch in Tagebaugebieten und diese durch Rekultivierung und Sukzession bedroht => schlechter Erhaltungszustand; regelmäßiger Brutvogel aktuell nur in Ost- und Nordsachsen	
352	Arenaria interpres	Steinwälzer	-	G	-	sg	unbekannt				x	x						x	keine Angabe, Gastvogel		
309	Himantopus himantopus	Stelzenläufer	-	B+G	VRL-I	sg	unbekannt				x								keine Angabe, Gastvogel	bislang 1 Brutnachweis	
367	Larus cachinnans	Steppenmöwe	R (als We)	J	-	bg	unzureichend				x	x						x	5 – 8 BP	Brutvorkommen nur lokal in NW- und NO-Sachsen	
183	Gavia stellata	Sterntaucher	-	G	VRL-I	bg	unbekannt				x	x						x	keine Angabe, Gastvogel		
540	Carduelis carduelis	Stieglitz	-	G	-	bg	unbekannt												15 000 – 30 000 BP		
238	Anas platyrhynchos*	Stockente*	V	J	-	bg	günstig	x	x	x	x			x	x			x	10 000 – 20 000 BP		
386	Columba livia f. domestica	Straßentaube	-	G	-	bg	unbekannt												20 000 – 40 000 BP		
364	Larus canus	Sturmmöwe	R	B+G	-	bg	unzureichend				x	x						x	150 – 200 BP	Brutvorkommen nur lokal in NW- und NO-Sachsen	
332	Limicola falcinellus	Sumpfläufer	-	G	-	bg	unbekannt				x	x							keine Angabe, Gastvogel		
500	Parus palustris	Sumpfmehle	V	J	-	bg	unbekannt												2 500 – 5 000 BP		
474	Aerocephalus palustris	Sumpfrohrsänger	-	G	-	bg	unbekannt												10 000 – 20 000 BP		
243	Aythya ferina	Tafelente	V	J	-	bg	*unzureichend				x	x						x	500 – 900 BP	Abnahme => unzureichender Erhaltungszustand	
503	Parus ater	Tannenmeise	V	J	-	bg	unbekannt												40 000 – 80 000 BP		
362	Gallinula chloropus	Teichralle	3	B	-	sg	unzureichend				x	x	x					x	600 – 1 200 BP		
475	Aerocephalus scirpaceus	Teichrohrsänger	-	G	-	bg	unbekannt												600 – 1 200 BP		
327	Calidris temminckii	Temminckstrandläufer	-	B	-	bg	unbekannt				x	x						x	keine Angabe, Gastvogel		
251	Melanitta nigra	Trauerente	-	G	-	bg	unbekannt				x	x						x	keine Angabe, Gastvogel		
497	Ficedula hypoleuca	Trauerschnäpper	V	J	-	bg	unbekannt												20 000 – 40 000 BP		
378	Chlidonias niger	Trauerseeschwalbe	0	B+G	VRL-I	sg	schlecht												0 – 1 BP	in Sachsen erst seit kürzlich wieder Brutvogel (2008; MTB 4653); Daten in zentraler ArtDatenbank des LFJLG betreffen Nachweise von Durchzüglern und sind unvollständig	
298	Porzana porzana	Tüpfelralle	2	B	VRL-I	sg	unzureichend				x	x						x	30 – 40 BP		

Art-ID ①	Artnamen (wissenschaftl.) ② <small>* Hervorhebung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen</small>	Artnamen (deutsch) ③ <small>* Hervorhebung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen</small>	RL ④	BS ⑤	EU ⑥	D ⑦	Erhaltungszustand (Entwurf) ⑧ <small>* begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung anhand des RL-Status</small>	Habitatkomplexe ⑨													Bestand in Sachsen ⑩ <small>Angaben entstammen Brutvogelatlas u.a. Quellen (BP=Brutpaare, Ind. = Individuen)</small>	Bemerkungen ⑪ <small>Bemerkungen, insbes. zur Einschätzung des Erhaltungszustandes und zur Verbreitung</small>				
								Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillegwässer, inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchgrünland/-staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderaltflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen			Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope		
389	<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube	V			bg																			7.000–14.000 BP	
284	<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke		J		sg	günstig	x	x											x	x				2 500 – 4 000 BP	
390	<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube		B		sg	*unzureichend	x	x															x	3 500 – 7 000 BP	
340	<i>Limosa limosa</i>	Uferschnepfe	0	G		sg	unbekannt			x	x	x												x	keine Angabe, Gastvogel	
426	<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe	3	B		sg	unzureichend			x	x												x	x	4.500–7.500 BP	
354	<i>Bubo bubo</i>	Uhu	2	J	VRL-I	sg	unzureichend																		65–75 BP	trots Zunahme von Revieren überwiegend nur geringer Bruterfolg, Erhaltungszustand wird als unzureichend eingeschätzt
464	<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel				bg																			7.000–14.000 BP	
295	<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel	3	B		bg	unzureichend																	x	900 – 3 000 BP	
301	<i>Crex crex</i>	Wachtelkönig	1	B	VRL-I	sg	schlecht							x											80–150 BP	
609	<i>Certhia familiaris</i>	Waldbaumläufer				bg																			15.000–30.000 BP	
399	<i>Strix aluco</i>	Waldkauz		J		sg	günstig	x	x																2 000 – 4 000 BP	
489	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger	V			bg																			8.000–16.000 BP	
401	<i>Asio otus</i>	Waldohreule	V	J		sg	günstig	x	x					x	x										1 200 – 3 000 BP	
339	<i>Scotopax rusticola</i>	Waldschnepfe		B		bg	günstig	x																	500–1.000 BP	
348	<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer	R	B		sg	unzureichend	x		x	x	x	x											x	10–20 BP	
290	<i>Falco peregrinus</i>	Wanderfalke	1	B	VRL-I	sg	schlecht																		20–25 BP	Zunahme besonders im Felsbrüterareal aber Abhängigkeit von Wiederansiedlungsmaßnahmen, Population nur lokal fest etabliert => schlechter Erhaltungszustand; zentrale Artendatenbank des LFULG enthält außerdem viele Nachweise von Nichtbrütern
442	<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel	3	J		bg	günstig				x														300 – 400 BP	Vervielfachung der Bestände erfolgt
297	<i>Rallus aquaticus</i>	Wasserralle	3	B		bg	unzureichend																	x	300–600 BP	
604	<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise				bg																			4.000–8.000 BP	
377	<i>Chlidonias hybridus</i>	Weißbart-Seeschwalbe		G	VRL-I	bg	unbekannt			x	x													x	keine Angabe, Gastvogel	
379	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Weißflügel-Seeschwalbe		G		sg	unbekannt																	x	keine Angabe, Gastvogel	
209	<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	3	B	VRL-I	sg	unzureichend		x	x	x	x			x	x									300 - 400 BP	
226	<i>Branta leucopsis</i>	Weißwangengans		G	VRL-I	bg	unbekannt																	x	keine Angabe, Gastvogel	
411	<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals	2	B		sg	*schlecht	x	x					x	x									x	300 – 400 BP	
259	<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	3	B	VRL-I	sg	unzureichend	x	x						x	x								x	150 – 300 BP	
410	<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf	1	B		sg	*unzureichend		x															x	40–60 BP	Brutvorkommen nur im nördlichen Sachsen; aktuell Bestandsstabilisierung => unzureichender Erhaltungszustand
433	<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper		B		bg	*unzureichend								x	x								x	2 500 – 5 000 BP	deutlicher Rückgang der Art bedingt unzureichenden Erhaltungszustand
271	<i>Circus pygargus</i>	Wiesenweihe	1	B	VRL-I	sg	schlecht								x	x								x	2–6 BP	unregelmäßiger Brutvogel, in der zentralen Artendatenbank überwiegend Darstellung von Durchzugsnachweisen
492	<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	V			bg																			30.000–60.000 BP	
298	<i>Falco cherrug</i>	Würgerfalke	R	B	VRL-I	sg	unbekannt																	x	0–1 BP	unregelmäßiger Brutvogel
443	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig				bg																			20.000–40.000 BP	
404	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ziegenmelker	1	B	VRL-I	sg	*unzureichend	x							x	x								x	300–400 BP	
490	<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp				bg																			60.000–120.000 BP	
290	<i>Ixobrychus minutus</i>	Zwergdommel	1	B	VRL-I	sg	schlecht				x	x												x	10–20 BP	
221	<i>Anser erythropus</i>	Zwerggans		G	VRL-I	bg	unbekannt																	x	keine Angabe, Gastvogel	
360	<i>Larus minutus</i>	Zwergmöwe		G	VRL-I	bg	unbekannt			x	x													x	keine Angabe, Gastvogel	
255	<i>Mergus albellus</i>	Zwergsäger		G	VRL-I	bg	unbekannt			x	x														keine Angabe, Gastvogel	
496	<i>Ficedula parva</i>	Zwergschnäpper	R	B	VRL-I	sg	unbekannt	x																	20–40 BP	
335	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Zwergschnepfe		G		sg	unbekannt			x	x	x	x											x	keine Angabe, Gastvogel	
214	<i>Cygnus columbianus</i>	Zwergschwan		G	VRL-I	bg	unbekannt				x	x												x	keine Angabe, Gastvogel	
376	<i>Sterna albifrons</i>	Zwergseeschwalbe	0	B	VRL-I	sg	schlecht			x	x													x	0–1 BP	
326	<i>Calidris minuta</i>	Zwergstrandläufer		G		bg	unbekannt			x	x													x	keine Angabe, Gastvogel	
187	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zwergtaucher	3	J		bg	unzureichend			x	x													x	700–1100 BP	

43 40 86 123 58 17 23 65 53 74 37 17 0 11 132

1 Art-ID	2 Artnamen (wissenschaftl.)	3 Artnamen (deutsch)	4 RL	5 BS	6 EU	7 D	8 Erhaltungszustand (Entwurf)	9 Habitatkomplexe	10 Bestand in Sachsen	11 Bemerkungen
	* Hervorhebung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen	Betrachtungsschwerpunkt B=Brutvogel, G=Gastvogel, J=Jahresvogel	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg=besonders geschützt, sg=streng geschützt	*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung anhand des RL-Status	Wälder Gehölze Fließgewässer, Quellen Stillgewässer, inkl. Ufer Sümpfe, Niedermoore, Ufer Moore Heiden, Magerrasen Grünland/Grünanlagen Feuchgrünland/-staudenfluren Äcker und Sonderkulturen Ruderalflächen, Brachen Gebäude, Siedlungen Höhlen, Bergwerksanlagen Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope Bergbaubiotope	Angaben entstammen Brutvogelatlas u.a. Quellen (BP=Brutpaare, Ind. = Individuen)	Bemerkungen, insbes. zur Einschätzung des Erhaltungszustandes und zur Verbreitung

grün = Habitatkomplexe im Untersuchungsgebiet

rot- Abschichtung/Filter nach Kriterien des Ablaufschemas zur Prüfung des Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (SMUL, 2010)

■ = Vogelarten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung

■ = häufige Brutvogelarten